

ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliđi Ölüm Oranlarındaki Eğilimler

Dr. İnci Tuğçe Çöllüođlu

ABD'de 1999'dan 2020'ye Kalp Yetersizliđi Ölüm Oranlarındaki Eğilimler Trends in Heart Failure Mortality in the USA 1999 to 2020

Dr. İnci Tuğçe Çöllüođlu

Kalp yetersizliđi (KY), Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir halk sađlığı sorunu olan karmaşık bir klinik sendromdur. KY tedavi stratejilerindeki ilerlemelere rağmen mortalitedeki azalma beklenen düzeyde deđildir. Bu çalışmada, 1999'dan 2020'ye kadar ırk ve cinsiyete göre sınıflandırılmış KY mortalite eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

CDC WONDER çoklu ölüm nedeni veri seti, ABD'de KY'den ölen (altta yatan ölüm nedeni) ve eşlik eden komorbiditeler nedeniyle ölen hastalarda ortalama ölüm yaşı ve yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı eğilimlerini analiz etmek için kullanılmıştır.

Sonuçlara bakıldığında; 1999'dan 2020'ye kadar KY'den ölen hastalar için yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı: 19.3 (Erkek: 21.3, Kadın: 17.7) ve ortalama ölüm yaşı: 83.2 (Erkek: 85.3, Kadın: 80.4, $p<0.01$) şeklinde tespit edilmiştir. Yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı için KY ile ölen hastalarda sırasıyla 72.4 (Erkek: 85.8, Kadın: 63.0) ve 81.1 (Erkek: 83.2, Kadın: 78.6, $p<0.01$) olduğu gözlenmiştir. Yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı her iki cinsiyette de iki yıllık dönem arasında sabit kalmıştır. İrklara göre, yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşına bakıldığında ise; komorbiditeler nedeniyle ölen beyaz ırk, siyah ırk ve diğer ırklardaki KY hastalarında sırasıyla yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı için (73.3, 75.1 ve 37.7, $p<0.01$) ve ortalama ölüm yaşı için (81.4, 74.0 ve 79.8, $p<0.01$) bulunmuştur. KY nedeniyle ölen hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşı beyaz ırk, siyah ırk ve diğer ırklar için (20.2, 22.5 ve 8, $p<0.001$) ve (84.0, 76.1 ve 85.1, $p<0.01$) olarak tespit edilmiştir. 1999-2020 yılları arasında, KY nedeniyle ölen hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı ve ortalama ölüm yaşında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak, komorbidite nedeniyle ölen KY'li hastalarda yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranında -0.5 ([-0.8]-[-0.1]) düşüş gözlenmiştir. Siyahi ırktaki hastalarda ortalama ölüm yaşında 1999'dan 2020'ye geldiğinde anlamlı düşüş gözlenmiştir (1999 yılı: 77.8, 2020 yılı: 74.3). Diğer ırklarda ise; ortalama ölüm yaşı yıllar içerisinde deđişmemiştir.

Sonuç olarak; KY tedavisinde mortalite açısından faydası kanıtlanmış kılavuzlara yönelik tıbbi tedavideki ilerlemelere rağmen, ABD'de ülke genelinde KY mortalite eğilimi plato çizmiştir. Siyahi ırktaki hastalarda KY'ye bađlı mortalitenin daha yüksek olduğu ırksal eşitsizlikler varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, KY gelişimini engellemek için ve KY'nin ilerlemesini önlemek ve tedavi stratejilerini optimize etmek için sistemik çabalara ihtiyaç olduğu düşünölmektedir.