

Kalp Yetersizliđi ile Bařvuran Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Kısa Dönem Sonuçlarının On Yıllık Geliřimi

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Kalp Yetersizliđi ile Bařvuran Hastaların Klinik Özelliklerinin ve Kısa Dönem Sonuçlarının On Yıllık Geliřimi

Ten Year Evolution of Clinical Characteristics and Short-term Outcome of Patients Admitted With Heart Failure

Dr. Gülsüm Meral Yılmaz Öztekin

Kalp yetersizliđi (KY), dünya apında morbiditenin, azalmıř yařam kalitesinin ve mortalitenin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Yařam kalitesinin azalmasına katkıda bulunan ise sıklıkla kalp dıřı nedenlerle iliřkili olan artmıř yeniden hastaneye yatıř oranıdır. Bu durum, KY popölasyonunun oklu morbiditesinin önemini vurgulamaktadır. Belika'da KY bařvurularının ayrıntılı klinik ve sonlanımların zaman iinde deđiřimi ile ilgili ok az veri mevcuttur.

alıřmanın amacı on yıl arayla KY ile bařvuran iki hasta grubunu klinik özellikler, komorbiditeler, KY ilaç ve cihazlarının kullanımı, taburculuktan üç ay sonra tekrar hastaneye yatıř oranı ve tüm nedenlere bađlı mortalite aısından deđerlendirmek ve karřılařtırmaktır.

Bu, Belika'da yürütölen tek merkezli, geriye döñük, gözlemsel bir kohort alıřmasıdır. alıřmaya akut dekompanse KY nedeniyle bařvuran ve sađ olarak taburcu edilen iki grup hasta dahil edildi ve karřılařtırıldı: 2011-2012 yılları arasında 340 hasta ve 2021-2022 yılları arasında 319 hasta. İki kohort arasında yař (77.3'e karřı 78.4 yıl), cinsiyet (%47.4'e karřı %44.5 kadın), ejeksiyon fraksiyonu azalmıř KY hasta sayısı (%47.4'e karřı %48.6) ve bařvuru sırasındaki NTproBNP (8514'e karřı 7398 pg/mL) aısından anlamlı farklılık görölmedi. Benzer řekilde diyabet, kronik obstrüktif akciđer hastalıđı, periferik arter hastalıđı, inme ve böbrek yetmezliđi gibi eřlik eden hastalıklar her iki grupta da benzerdi. Taburculuk sırasındaki tıbbi tedaviyle ilgili olarak, mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) son kohortta önemli ölçüde daha sık kullanılmaktaydı. Ancak beta-bloker veya renin anjiyotensin aldosteron sistem antagonistlerinin kullanılmasında herhangi bir deđiřiklik yoktu. Ejeksiyon fraksiyonunu azalmıř KY'ne yönelik yeni tedavilerden hastaların %29'una sodyum-glukoz kotransporter-2 (SGLT2) inhibitörleri, %13'üne sakubitril/valsartan reçete edilmiřti. Defibrilatörlerin (ICD) ve resenkronizasyon cihazlarının (CRT) kullanımı 2011-2012'den 2021-2022'ye iki katına çıkmıřtı (%3.9'a karřı %9.6, $p=0.002$). Hastanede kalıř süresi, tüm ejeksiyon fraksiyonu alt gruplarında on yıllık bir süre iinde 7 günden 5 güne önemli ölçüde azalmıřtı. Taburculuktan üç ay sonra KY nedeniyle tekrar hastaneye yatıř ve tüm nedenlere bađlı ölümlerin birleřik sonlanımı yaklaşık %20'de sabit kalmıřtı.

Sonuç olarak akut dekompanse KY ile bařvuran hastaların klinik özellikleri ve komorbiditelerinin 2011-2022 yılları arasında anlamlı bir deđiřiklik göstermediđi göröldü. KY iin kanıta dayalı ilaçların (özellikle MRA, SGLT2 inhibitörleri ve sakubitril/valsartan) ve ICD / CRT kullanımı artmıřtı, böylece kayda deđer bir gelişme potansiyeli izlenmiř oldu. Hastanede kalıř süresi zaman iinde önemli ölçüde azalmasına rađmen, taburculuktan sonraki 90 gün iinde KY nedeniyle yeniden hastaneye yatıř ve tüm nedenlere bađlı ölüm oranları yüksek kalmıř ve iyileřme olmamıřtır. Bu i karartıcı sonuçlar, KY hastalarının bakımını ve sonuçlarını iyileřtirmeye yönelik abaların sürdürölmesi ihtiyacını göstermektedir.