.

DAPARHT | Dapagliflozin Kalp Nakli Sonrası eGFR Seyrini İyileştirdi

Prof. Dr. Erdal Belen

DAPARHT | Dapagliflozin Kalp Nakli Sonrası eGFR Seyrini İyileştirdi

Prof. Dr. Erdal Belen
S.B.Ü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

AHA 2026'da sunulan çift kör, randomize çalışmada, kalp naklinin üzerinden en az bir yıl geçmiş ve eGFR'si ≥25 mL/dk/1,73 m² olan 430 erişkin, dapagliflozin 10 mg/gün veya plaseboya randomize edildi. Başlangıçta ortalama eGFR 67 mL/dk/1,73 m², nakilden sonra geçen medyan süre 7 yıl idi.

Primer sonlanım olan 2. hafta ile 12. ay arasındaki eGFR değişimi, dapagliflozin grubunda +2,0, plasebo grubunda +0,3 mL/dk/1,73 m² idi (gruplar arası fark +1,7, %95 GA 0,1–3,3, p=0,03). Bu ölçüm, tedavinin ilk iki haftasındaki eGFR değişimini dışarıda bırakıyordu. Enfeksiyonlar dâhil advers olay oranları genel olarak benzerdi.

Çıkarılacak mesaj

Dapagliflozin, kalp nakli alıcılarında ilk iki haftadan sonraki eGFR seyri üzerinde mütevazı bir yarar sağladı. Bu farkın uzun vadede böbrek yetmezliği veya diyaliz riskine nasıl yansıyacağı başka çalışmalarla araştırılmalıdır.

Referans: *Holmen S, Manintveld O, Damman K, Haugen Löfman I, Szymanski M, Braun O, et al. Dapagliflozin for renal protection in heart transplant recipients: a randomized clinical trial. Circulation. Published online November 8, 2026. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.126.083760.*