

CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve str bazlı geniş vaskler kapatmanın randomize karşılařtırılması

Dr. Ezgi amlı

Yorumlayan: Dr. Ezgi amlı

alıřmanın Adı: CHOISE-CLOSURE: Tıkaç bazlı ve str bazlı geniş vaskler kapatmanın randomize karşılařtırılması

Yayınlandığı Kongre: TCT/2021

Link: <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057856>

Giriř:

En yaygın olarak transfemoral giriř yolu ile gerekleřtirilen transkateter aort kapak replasmanı (TAVR), řiddetli aort darlıđı olan hastalarda cerrahiyle birlikte kabul edilen bir tedavi alternatifidir. TAVR sırasında 2 farklı vaskler kapatma cihazı (VCD) stratejisi vardır, biri tıkaç tabanlı diđerisi ise str tabanlı vaskler kapatma cihazı stratejisidir.

Ama:

alıřmanın amacı, 2 farklı VCD stratejisinin etkinlik ve gvenilirliđini tespit etmektir.

Metod:

CHOISE-CLOSURE alıřması, transfemoral eriřim yoluyla transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) uygulanan hastalarda tıka temelli bir tekniđin (MANTA) primer str temelli teknikle (ProGlide) karşılařtırıldıđı ok merkezli, randomize bir alıřmadır. Birincil son nokta, Valve Akademik Arařtırma Konsorsiyumu-2 kriterlerine gre tanımlanan, indeks hastaneye yatıř sırasında giriř yeri veya giriřle ilgili majr ve minr vaskler yaralanmanın bileřimiydi. İkincil sonlanım noktası ise hastane ii ve 30 gnlk vaskler komplikasyonları; kanama; kapatma iřleminin bařarısızlıđı, tm nedenlere bađlı lm; hemostaz zamanı olarak tanımlanmıřtır.

Bulgular:

CHOISE-CLOSURE alıřmasında 516 hasta randomize edilmiřtir (ortalama yař 80.5±6.1 yıl, %55.4 erkekti, hastaların %7.6'sında periferik vaskler hastalık vardı ve ortalama Society of Thoracic Surgeons skoru %4.1±2.9 idi). Ortak femoral arterin ortalama boyutu ve giriř yeri zellikleri her iki grup arasında benzerdi. Birincil son nokta, saf tıka bazlı grubun %19,4'nde (50/258) ve str bazlı grubun %12,0'ında (31/258) meydana geldi (p=0.029). Gruplarda srasıyla giriřime bađlı kanama %11,6'ya karřı %7,4 (RR: 1.58, %95 CI: 0.91-2.73, p=0.133) ve kapatma iřlemi bařarısızlıđı 4,7'ye karřı %5,4 (RR: 0.86, %95 CI: 0.40-1.82, p=0.841) tespit edildi. Hemostaz sresi, str ile kapamada ortalama 80 saniye ile ortalama 240 saniyede olan tıka tabanlı kapamaya kıyasla anlamlı olarak daha kısaydı (p<0.001).

Sonuç:

alıřma, transfemoral TAVR uygulanan hastalar arasında, tıka tabanlı MANTA tekniđi kullanılarak yapılan vaskler kapatma stratejisinin str tabanlı ProGlide tekniđine kıyasla; giriř yeri veya giriřle ilgili vaskler komplikasyon oranlarının daha yksek ancak daha kısa hemostaz sresi ile iliřkili olduđunu gstermiřtir.

Yorum:

Tıka temelli tekniklere kıyasla ncelikli olarak str temelli tekniklerin kullanılması, daha az vaskler komplikasyonla iliřkilidir. Ultrason kılavuzluđunda ponksiyon, yksek orandaki birincil ve ikincil sonlanımları azaltabilir. Str temelli strateji bařarısız olduđunda, MANTA tekniđi uygulayıcılar iin tamamlayıcı bir tedavi seeneđi olabilir.