

Diyabeti ve koroner arter hastalığı olan hastalarda amphiliimus ve zotarolimus salınlı stentlerin karşılaştırılması (SUGAR çalışması)

Dr. Büşra Güvendi Şengör

Yorumlayan : Dr. Büşra Güvendi Şengör

Çalışmanın Adı : Diyabeti ve koroner arter hastalığı olan hastalarda amphiliimus ve zotarolimus salınlı stentlerin karşılaştırılması (SUGAR çalışması)

Yayınlandığı Kongre : TCT 2021

Link : <https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab790/6420223>

Giriş :

Dünya çapında 463 milyon insanı etkileyen, önemli bir dağlık sorunu olan diyabet, sıklıkla semptomatik koroner arter hastalığına yol açmaktadır. Genellikle modern ilaç kaplı stentlerle perkütan girişim uygulanır ancak diyabetik hastalar, olumsuz sonuçlar açısından hala risk altındadır. Polimersiz, ince strutları olan Cre8 EVO stentleri, amfililik taşıyıcılarla sirolimus salınımı yapar. Randomize olmayan birkaç çalışma ve küçük ölçekli randomize birkaç çalışma, diyabetik hastalarda Cre8 EVO stentlerinin klinik faydalarını göstermiştir. Bu nedenle, SUGAR çalışması, diyabetik hastalarda Cre8 EVO stentini, Resolute Onyx stentine (modern, polimer bazlı, zotarolimus salınlı) karşı değerlendirmek üzere planlanmıştır.

Amaç :

Araştırmacılar, diyabet ve koroner arter hastalığı olan hastalarda, Cre8 EVO stentlerini Resolute Onyx stentleri ile karşılaştırmayı amaçladılar.

Method :

Araştırmacı tarafından başlatılan, prospektif, randomize (1:1), çok merkezli, kontrollü SUGAR çalışmasına, 18 yaş ve üzerinde, ADA tanı kriterlerine göre diyabeti olan, PCI için uygun ve semptomatik koroner arter hastalığı ya da sessiz iskemi ile birlikte en az bir koroner arterde darlığı (> %50) olan hastalar, klinik başvuruya (kronik ya da akut koroner sendromla başvuru), lezyon kompleksliğine, tedavi edilen lezyon sayısına veya implante edilen stent sayısına bakılmaksızın dahil edildi. Dışlanma kriterleri, yaşam beklentisinin 2 yılın altında olması, başvuruda kardiyojenik şokun olması, mekanik ventilasyon ihtiyacı olması, en az 1 aylık DAPT tedavisine kontrendikasyon olması ve gebeliktir. Dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar, 1:1 olarak Cre8 EVO ve Resolute Onyx stentine randomize edildi. Balon expandable, polimersiz, kalınlığı 70-80 µm olan Cre8 EVO stentleri sirolimus salınımının %70' ini ilk bir ayda yaparken, kalanın tamamını 90 gün içinde yapar. Balon expandable, polimer kaplı, kalınlığı 92-102 µm olan Resolute Onyx stentleri, zotarolimus salınımını 180 gün içinde yapar. Çalışmada, hastalara PCI uygulandı, mevcut rehberlere göre uygun medikal tedavi verildi ve hastalar ortalama 25 ay takip edildi. Birincil sonlanım noktası, 1 yılda kardiyak ölüm, hedef damar kaynaklı MI ve hedef damar revaskularizasyon endikasyonu birleşiminden oluşan, hedef lezyon başarısızlığı olarak belirlendi. İkincil sonlanım noktası ise tüm nedenlere bağlı ölüm, hedef damar revaskularizasyonu, herhangi bir revaskularizasyon, tüm MI' lar, hedef lezyon başarısızlığı, muhtemel ya da kesin stent trombozu ve major kardiyak olumsuz olaylardı. Çalışmada, Cre8 EVO stentlerinin, Resolute Onyx stentlerine göre 1 yılda noninferiyorite açısından değerlendirilmesi planlandı. Yüzde 4' lük mutlak fark noninferiyorite sınırı olarak belirlendi ($\alpha= 0.025$, $\beta= 80\%$, 8% kontrol grubunda beklenen olay oranı, 1.5 rölaf risk). Noninferiyorite karşılanırsa, üstünlük analizi planlandı. Analiz, tedavi niyetine dayanarak yapıldı, ancak, ek analizler gerçekte alınan tedaviye göre yapıldı.

Bulgular :

Çalışmada, 1175 hasta, Cre8 EVO stent (586 hasta) ve Resolute Onyx stent (589 hasta) grubuna rastgele atandı. Hastaların çoğu erkekti ve tip 2 diyabet oranı %95.5 olup bunların %32' si insulin tedavisi almaktaydı. Prosedür için en sık endikasyon NSTEMI iken, hastaların % 12' si STEMI ile başvurmuştu. Hastaların yarısında çok damar hastalığı vardı, çoğu hastada Syntax skoru en düşük tertileydi. İki grup, karakteristik ve işlemsel özellikler açısından benzerdi. Birincil sonlanım noktası olan hedef lezyon başarısızlığı, Cre8 EVO grubundaki hastaların %7.2' sinde görülürken, Resolute Onyx grubundaki hastaların %10.9' unda görüldü (fark %-3.73, [%95 CI -7.01 to -0.45], noninferiyorite için $p < 0.001$; HR 0.65, [%95 CI 0.44 to 0.96], üstünlük için $p = 0.030$). Hedef lezyon başarısızlığı, klinik olarak endike hedef lezyon revaskularizasyonu ve major kardiyak olaylardan oluşan ikincil sonuçlar Cre8 EVO grubunda, Resolute Onyx grubuna göre anlamlı ölçüde azdı (sırayla, %7.5 - %11.1, HR 0.67 [%95 CI 0.46 to 0.99], $p = 0.042$; % 2.4 - %3.9, $p = 0.058$; %11.7 - %15.7, $p = 0.067$), diğer ikincil sonuçlar iki grup arasında benzerdi. Cre8 EVO stentleri ile hedef lezyon başarısızlığı oranı, alınan tedaviye göre yapılan analizde de, tedavi niyetine göre yapılan analize benzer şekilde anlamlı derecede düşüktü.

Sonuçlar :

Perkütan girişim uygulanan diyabetik hastalarda, Cre8 EVO stentleri hedef lezyon başarısızlığı açısından Resolute Onyx stentlere noninferiyor bulunmuştur. Bir yıllık önceden belirlenmiş üstünlük analizleri de, Cre8 EVO stentlerin hedef damar başarısızlığı açısından Resolute Onyx stentlere üstün olduğunu düşündürmektedir.

Yorum :

SUGAR alıřması, diyabeti olan hastalarda 2. jenerasyon ila kaplı stentleri karřılařtıran ilk gl ve nemli alıřmadır. alıřmada tm hastaların diyabetik olması nedeniyle, geniř bir diyabetik populasyonu ieren ilk alıřmadır. Kompleks lezyonlu hastaların dahil edilmesi ve gncel rehberlerin nerdiėi yeni ilaların kullanımı alıřmayı nceki alıřmalardan ayırmaktadır ve gerek poplasyonun daha iyi temsil edilmesi saėlanmaktadır. alıřmada Cre8 EVO grubunda, Resolute Onyx grubuna gre %35' lik rlatif risk azalması gsterilmiřtir. Resolute Onyx' in ince kenarları kalsifiye, tortiyz ve uzun lezyonlardan geiř kolaylıėı saėlasa da, Cre8 EVO stnlk saėlayacak bazı etkileyici zelliklere sahiptir. Polimersiz oluřu, daha ince olmasına neden olur ve polimer kaynaklı damar duvarında oluřacak inflamasyonu azaltır. Amfifilik tařıyıcı sayesinde ila etkisi de daha yksektir. alıřmada Resolute Onyx kolunda, takibin 8. ayında hedef lezyon bařarısızlıėı aısından nemli bir fark bařlamıřtır ve restenoz bu noktadan sonra daha belirgin hale gelmiřtir; bu nedenle daha uzun takip gerekir. Ayrıca kompleks lezyonlar alıřma dıřı bırakılmasa da, ortalama Syntax skoru en dřk tertildedir. Bu nedenle Cre8 EVO' nun kompleks koroner anatomili hastalarda sonuları belirsizliėini korumaktadır.